

Műtéti tájékoztató

Császármetszéshez

A beteg neve:

Született:

TAJ:

Tisztelt Hölgylem!

A terhesség illetve a szülés befejezésének azt a módját, amelynek során a természetes szülő utak megkerülésével, hasműtét útján hozzuk világra a magzatot, császármetszésnek nevezzük.

Tájékoztatónk azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, mi a műtét javallati köre, technikai kivitele és mik lehetnek a szövödményei.

Császármetszést végzünk minden esetben, ha a terhesség, vagy a szülés folyamán valamilyen rendellenesség, betegség fenyegeti az anyát, a magzat esetleg mindkettőjük egészségét, életét, illetve ha a műtéti beavatkozással megelőzhetünk előre látható szövödményeket. Az okot mely a műtéti beavatkozást szükségessé teszi, a műtét javallatának nevezzük.

A császármetszés javallati köre két fő csoportra tagozódik:

1. életmentő javallat minden olyan szövödmény, amely a terhesség, szülés alatt az anya és a magzat, vagy mindkettő életét közvetlenül fenyegeti./ vérzés, köldökzsinór előesés /. Ilyen esetben a műtétet sürgősséggel altatásban végezzük. A császármetszést szükségessé tevő vérzés olyan fokú is lehet, hogy az anya életének megmentése érdekében a méhet is el kell távolítanunk.

2. megelőző javallat alapján akkor végzünk császármetszést, ha a meglevő vagy fenyegető szövödménynek a kialakulását előzhetjük meg. / pl: az anya szívbetegsége, magzati harántfekvés, téraránytalanság/.

Előkészítés: a műtőbe szállítás előtt a szeméremszőrötét részlegesen leborotváljuk, majd hólyag katétert vezetünk fel. Bal karjába infúziót kötünk be, amin keresztül adagoljuk a szükséges gyógyszereket, folyadékot pótolunk.

Műtét előtt 20ml savlekötő folyadékot kell innia. A műtét gerincvelő érzéstelenítésben, esetleg altatásban történik. Az érzéstelenítés lehetséges módozatairól, illetve az Ön esetében tervezett eljárásról az altató orvos tájékoztatja.

A műtét lényege: hogy a hasüreg feltárását követően kiemeljük a magzatot. Császármetszés esetén a bőrmetszés haránt irányú, ritkán hosszanti, eseti elbírálás alapján. Életveszély elhárítása esetén hosszanti metszést ejtünk. A méh sebet összevarrjuk és a sebet hashártyával fedjük. Osztályunkon korszerű, szöveteket kímélő, kevés sérülést okozó sebészeti technikát alkalmazunk. A hasfalba esetenként vékony műanyag csövet helyezünk, hogy a sebváladék kiürülését biztosítsuk. Ezt általában a műtétet követő 1-2. napon távolítjuk el. A bőrt varrattal zárjuk. Ezeket 4-5. napon távolítjuk el.

A műtét utáni időszak: 4 órán át megfigyelik a szülőszobán, ezután a szülészeti osztály gyermekágyas kórtermébe kerül. Első napon bőségesen kap előbb folyadékot, majd diétás ételeket. Fájdalomcsillapítót injekció vagy tableta formájában adunk. A műtét előtt felvezetett hólyag katétert 12-24 óra múlva távolítjuk el, az Ön általános állapotától függően. A bélműködés biztosítása céljából a 2. napon végbélkúpot vagy hashajtó folyadékot kap.

Mint minden műtéti beavatkozásnak, a császármetszésnek is van kockázata. Igen ritkán műtét közben előfordulhat a húgyutak sérülése, belek sérülése, vérzés, utóvérzés, gyulladás. Ezek a szövödmények igen ritkán fordulnak elő, elhárításukra, ellátásukra természetesen fel vagyunk készülve.

Szövődménymentes gyógyulás esetén az újszülött állapotának függvényében 4-5. napon bocsátjuk haza.

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy kórházi felvételre az osztályon érvényes dokumentumokkal (személyi igazolvány, TAJ kártya, vizsgálati eredmények) és a bent tartózkodásához szükséges egyéb személyes holmijával (papucs, hálóing, törülköző, vatta vagy betét) jelenjen meg.

Amennyiben terhessége vagy egyéb betegsége miatt gyógyszert kell szednie, azokat is hozza magával!

Az írásos ismertetőt kellő alaposággal áttanulmányoztam, megértettem, további kérdésem nincs, illetve azt a kezelő orvossal megbeszélem. A tervezett műtétbe beleegyezem.

Balassagyarmat, 20.....

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása