

Tájékoztató - A SZÜLÉS MÓDJA ELŐZETES CSÁSZÁRMETSZÉS UTÁN

Megelőző császármetszés után akár a természetes szülésnél, akár a következő császármetszésnél nagyobb arányú kockázattal kell számolnunk, mint az első gyermek születésekor. Bár a terhesség hüvelyi szüléssel történő befejeződése igen kedvező élettani és pszichológiai hatással bír mind az újszülöttre, mind a várandós kismamára nézve, figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a császármetszés során a méh elülső falát kell megnyitnunk majd összevarrnunk, s ez a sebzés heggel gyógyul. Mérlegelnünk kell tehát a természetes szülésnél a méh hegének szétválási kockázatát és az ebből adódó veszélyállapot magzatra nézve megbetegítő, nagyon ritkán súlyos károsodást is eredményezhető hatását (magzati elhalás tíz ezerből tíz esetben következett be. 10/10 000), másrészt az anyát érintő esetleges szövődményeket, valamint az ismételten végzett császármetszés előnyeit és hátrányait.

Az Ön kívánságait messzemenőleg figyelembe vesszük, ezért szóbeli és írásos tájékoztatónkkal szeretnénk Önnek segíteni a döntése meghozatalában.

Megelőző császármetszések után lezajlott hüvelyi szülésekkel szerzett tapasztalatokról és statisztikai adatokról szeretnénk Önt tájékoztatni:

- A méh hegének szétválása ritka, de létező jelenség: 1x előzetes császármetszés után lezajlott tíz ezer hüvelyi szülésből 32 esetben észleltek hegészétválást (32/10 000), ha a szülés nem magától indul, vagyis szülésindítás történik, akkor ez az érték két és félszeresére növekszik (80/10 000)
- Ez a kockázat még tovább nő: többszörös előzetes császármetszés után (170/10 000) illetve a 18-24 hónapnál rövidebb időn belül bekövetkezett terhességnél (270/10 000), valamint várhatóan nagy magzat esetén

A vajúdas alatti folyamatos magzati szívhang monitorizálással, valamint a szülés előrehaladásának gyakori ellenőrzésével a magzat károsodásának esélye minimalizálható. Súlyos veszélyhelyzetben a magzat gyors világrahozatala érdekében sürgős műtétet végzünk.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a vajúdas alatt szülési fájdalomcsillapításra kérhető epidurális érzéstelenítés (EDA), mivel nem növeli a szövődmények kockázatát. Nem kielégítő fájástevékenység erősítésére ellenőrzött módon oxitocin-infúziót adunk.

Az ismételten végzett császármetszés kockázata az eredeti szövetnél gyengébb hegyszövet képződésében (mely a következő terhességre is hatással van) és a császármetszés, mint hasi műtét során esetleg bekövetkező sérülések, vérzések, fertőzésekben van. Az ismételt hasi műtét a hasfal izmait gyengítheti. A most bekövetkező esetleges szövődmények az élet későbbi szakaszában szükségessé váló hasi műtétek kivitelezését megnehezíthetik.

Mivel két előzetes császármetszés már jelentősen növeli a hegszétválás kockázatát, ezért a hüvelyi szülést ez esetben osztályunkon nem támogatjuk, a szülés várható időpontját néhány nappal megelőző, előre egyeztetett napon császármetszést végzünk.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Ezen tájékoztató aláírásával igazolom, hogy az előzetes császármetszésből adódó fokozott kockázatokról tájékoztattak, a felmerült kérdéseimet volt módom akár szóban, akár írásban feltenni és azokra kielégítő válaszokat kaptam. A döntésemnek megfelelő beleegyező nyilatkozatot aláírom.

Tudomásul veszem azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Budapest,

várandós aláírása

tanú aláírása

orvos aláírása