

## Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat császármetszés elvégzéséhez

A császármetszés a magzat hasi úton, műtétrel történő megszületését jelenti. A császármetszést magzati, anyai és együttes okok tehetik indokolttá. A várandósság vagy a vajúdas alatt kialakulhat olyan helyzet, amely során a császármetszés a hüvelyi szülésnél biztonságosabb szülés befejezést jelent. A császármetszés javallata egyes esetekben már a vajúdas megkezdése előtt adottak, ilyenkor a szülést eleve császármetszéssel vezetjük/pl. harántfekvés, egyes szívbetegségek, egyes az előzményben szereplő méhjen végzett műtétek stb./ Sürgősségi indokok a vajúdas alatt léphetnek fel, amikor a magzat állapota /pl. fenyegető méhen belüli oxigénhiány/, az anya állapota /pl. súlyosbodó terhességi mérgezés/ vagy mindkettő együttes érdeke /pl. vérzés/ miatt a hüvelyi szülés veszélyesebb mint a császármetszés elvégzése.

A császármetszés javallatának megtételekor minden alkalommal mérlegeljük a műtét fokozott kockázatát a hüvelyi szüléssel szemben.

**Az eljárás menete, technikája:** A műtét végezhető a beteg kérése szerint altatásban, gerincvelői érzéstelenítésben (spinal anaesthesia), és epidural anaesthesiában. Műtéti előkészítésként a szeméremszőrzetet leborotváljuk, a hólyagba állandó katétert helyezünk, és véna kanült helyezünk be a karvénába.

Műtői körülmények között, a sterilitás szabályainak betartásával a hason bikini vonalban a haránt irányban kb. 10 cm-es szakaszon bőrmetszést ejtünk. A hasfal rétegeit a kötőszövetes lemez kivételével tompán széthúzzuk (zsír, izom, hashártya). A méh falát kb. 2 cm-es szakaszon megnyitjuk, majd tompán ujjal a megfelelő méretig tágítjuk. Az így keletkezett nyíláson keresztül kiemeljük az újszülöttet, a köldökzsinórt átvágjuk, a méhlepényt eltávolítjuk, a méhűrt kiürítjük, a méh sebét és a hasfalat rétegenként összevarrjuk.

**Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:** A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szemben túlérzékenységi reakció jelentkezhet. A műtét során ritkán sérülhet a húgyhólyag, méhfal. A keletkezett sérüléseket varratokkal látjuk el. Műtét során súlyos vérzés léphet fel, elsődlegesen gyógyszeres terápiát alkalmazunk, amennyiben a vérzés nem szűnik, méhkivétel jöhet szóba. Műtétet követő időszakban gyulladás alakulhat ki a méhben és a hasfalban, ennek lokális és szisztémás gyógyszeres kezelése jön szóba. Ennek megelőzésére a műtét során egy adagban antibiotikus kezelést alkalmazunk.

A császármetszés el nem végzése a magzat, és vagy az anya súlyos károsodását okozhatja.

**A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:**

**A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:**

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok – nem járulok hozzá – a fenti beavatkozás elvégzéséhez.

Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre álltak tudomásul véve azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Budapest,

Beteg aláírása

tanú aláírása

orvos aláírása