

## **Beleegyező nyilatkozat szülésindukcióhoz**

**Az eljárás lényege: a szülés mesterséges elősegítése annak megindulása előtt.**

### **Az eljárás indoka:**

Szülésindításra bizonyos magzat és/vagy anyai veszélyállapotokban van szükség (pl. terminustúllépés, a betöltött 41. hét, magzat méhen belüli sorvadása, esetleges fejlődési rendellenességek, méhen belüli elhalás, terhességi mérgezés toxaemia, fenyegető oxigénhiányos állapot, az anya valamely súlyos szervi megbetegedése /szíív, vese 1 típusú cukorbetegség stb)

### **Az eljárás technikája:**

Szülésindítás a méhszáj állapotától (Bishop score) függően történik ún. méhszájérleléssel, valamint burokrepesztéssel, szükség esetén oxitocinos infúzióval. Intézményünkben mechanikus méhszájérlelést alkalmazunk, melynek során puha húgycsőkatétert vezetünk a méh nyakcsatornájába, a katéter végén található ballont steril sóoldattal feltöltjük, néhány óra alatt a méhszájat mechanikusan kitágítja. Előnye, hogy alkalmazása egyszerű, tekintettel arra, hogy hatóanyagot nem tartalmaz, mellékhatásokkal nem kell számolni, alkalmazása bármikor felfüggeszthető, a kismamát szabad helyváltoztatásban, mozgásban stb. nem korlátozza. Burokrepesztés nyitott méhszájnál lehetséges, ekkor a magzatburkot megrepesztve a magzatvíz egy része elfolyik, ezáltal az előfekvő magzati koponya (ritka esetben magzati far) hatékonyabban tágíthatja a méhszájat. Megfelelő méhizom működés hiányában oxitocinos infúziót alkalmazunk. Az infúziók megfelelő szerkezettel juttatjuk be az anyag keringésébe.

### **Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:**

Fentiekben részletezett okok miatt ballonos méhszájérlelés során kevés táglási vérzésen kívül egyéb mellékhatással nem kell számolni. Művi burokrepesztés esetén, ritkán előfordulhat köldökzsinór, egyéb magzati aprórész (kéz, láb stb.) előesése, mely megfelelő ellátással kezelhető. Szülésindukáció esetén a szülést befejező műtétek és a császármetszés aránya gyakoribb.

### **Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei:**

Amennyiben a fenti javallatok fennállása ellenére nem történik szülésindítás, a magzatnál, illetve a később megszületett újszülöttnél oxigénhiányos állapot, súlyos esetben méhen belüli elhalás, az anyánál az alapbetegségtől függően eclampsia, szepszis, egyéb életveszélyes állapot alakulhat ki.

### **A fentiekről számomra részletes tájékoztatást adott.**

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok nem járulok hozzá a fenti beavatkozás elvégzéséhez. Jelen döntésem akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre álltak, tudomásul véve azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ezidáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Várandós aláírása

tanú aláírása

orvos aláírása