



RÉSZLETES BETEGTÁJÉKOZTATÓ NYILATKOZAT

BEAVATKOZÁS: SZÜLÉSINDÍTÁS

Beteg neve: Születési ideje: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy anyai és/vagy magzati szövödmények (vélelmezett terminusának túllépése, a magzat méhen belüli sorvadása, cukorbetegség, terhességi „mérgezés”, stb.) miatt szülésének megindítása szükséges, ami szakmailag megalapozott, az Ön érdekeit leginkább szolgáló megoldás. A Szülészeti-nőgyógyászati Osztály a beavatkozásról az alábbiakban tájékoztatja Önt, hogy – mindent mérlegelve – dönthessen, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozás elvégzéséhez. A beavatkozásról az azt végző orvos Önnek (vagy törvényes képviselőjének, hozzátartozójának) szóban egyéniesített részletes tájékoztatást ad, ami az Ön számára szükséges, érthető, és állapotában megfelelő.

A beavatkozás jellege:

A méhnyak és méhszáj állapotától függően hólyag katétert helyezünk a méh nyakcsatornájába, ballonját sóoldattal feltöltjük, ezáltal a méhnyak néhány óra alatt kitágul, és burokrepesztésre alkalmassá válik. A burok megrepesztése után a szülés legtöbbször egyéb beavatkozás nélkül beindul; ha a fájások spontán nem kezdődnek el, oxitocin infúzió bekötése válhat szükségessé. A katéteres méhnyak tágítás előnye, hogy kivitelezése egyszerű, hatóanyagot nem tartalmaz, ezért általános mellékhatásoktól nem kell tartani, alkalmazása bármikor felfüggeszthető, és a kismamát mozgásában nem korlátozza.

A beavatkozás célja:

A méhnyak feltágítása, a burok megrepesztése, szükség esetén oxitocin infúzió adása a szülés megindítása céljából.

Hogyan történik a beavatkozás?

A méhnyakba kéz segítségével, vagy hüvelyi feltárás mellett katétert vezetünk be, amelynek ballonját feltöltjük. A burok megrepesztése fájdalomtalan, megfelelő eszköz segítségével kéz védelme mellett történik. A katéter felhelyezését, ill. a burok megrepesztését követően legalább 20 perces magzati szívhang-hallgatás (un. CTG, vagy NST vizsgálat) szükséges a szülőszobán.

Mi a beavatkozás esetleges szövödményei?

Ha a katéter feltöltött ballonja túl magasra, a belső méhszáj fölé kerül, a magzati koponya nyomása miatt átmeneti reflexes magzati szívhang-lassulás következhet be, ami nem jelenti a magzat oxigénhiányos állapotát és a katéter lejjebb húzása után általában oldódik. A méhnyak tágulását kevés vérzés kísérheti.

A burok megrepsztesét nagyon ritkán a köldökzsinór, vagy magzati aprórész (kéz, láb) előesése, vagy vérzés követheti; ezek megfelelő ellátással kezelhetők: a szövődmények elhárítására, ellátására és gyógyítására kórházunkban a feltételek biztosítva vannak.

Szülésindítás esetén a szülésbefejező műtétek (császármetszések) száma nagyobb.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A katéteres méhnyak tágítás alternatívái a gyógyszeres méhnyak érlelés, ill. sürgős esetben vagy már nyitott méhszáj esetén előzetes méhnyak érlelés és méhnyak-tágítás nélkül szülésindítás burokrepsztesssel és/vagy oxitocin infúzióval. Önnél a katéteres méhnyak tágítást tartjuk a leghatékonyabb eljárásnak, ezt követheti majd a burok megrepsztesése, szükség esetén oxitocin infúzió adása.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

Anyai és/vagy magzati egészségromlás, a magzatnál, ill. az újszülöttnél oxigénhiányos állapot, méhen belüli elhalás, az anyánál az alapbetegségtől függően eklampszia, szepszis (vérmérgezés) következhet be.

Beleegyezési nyilatkozat:

A szülésindításról a tájékoztatót elolvastam, az orvos szóbeli tájékoztatását megértettem, az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem és kérem annak elvégzését.

Budapest, év, hó, nap, óra, perc

.....
felvilágosítást végző orvos aláírása

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Az ellátás visszautasítása miatt bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősség nem terheli, és kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült költségek megtérítésére.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, aminek elmaradása az életét veszélyezteti, vagy aránytalanul súlyos terhet, ill. maradandó károsodást okozhat, az elutasító nyilatkozatot két tanúnak az aláírásával is hitelesíteni kell).

Budapest, év, hó, nap, óra, perc

.....
felvilágosítást végző orvos aláírása

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

.....
1. sz. tanú aláírása

.....
2. sz. tanú aláírása

Ezen lap egy példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!