



BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Szülészeti fájdalomcsillapításról (Peridurális érzéstelenítésről)

Tisztelt Páciensünk!

Ezen rövid tájékoztatót az Ön megfelelő felvilágosítása érdekében készítettük. Kérjük, tekintse át gondosan és amennyiben ezek után is maradnak megválaszolatlan kérdései, forduljon ezekkel bizalommal kezelőorvosához vagy az intézet személyzetéből bárkihez.

A szülési fájdalom az egyetlen természetes fájdalom. Ennek csillapítására irányuló törekvések az orvoslás őskorába nyúlnak vissza. Nehéz olyan módszert találni, amely enyhíti, vagy teljesen megszünteti a vajúdás fájdalmait, de ugyanakkor a magzatra nem károsak a használt gyógyszerek. Napjainkban egyik legeredményesebb alkalmazott módszer a gerincközeli, szakmai nyelven a lumbális epidurális (peridurális) érzéstelenítés.

A gerincközeli (LPDA) érzéstelenítés alkalmával a csontos gerinccsatorna és a gerincvelő külső burka közé egy erre alkalmas túvel speciális kanült vezetünk fel, helyi érzéstelenítés után.

A kanülon keresztül adagoljuk a fájdalomcsillapítást előidéző gyószert. Ezzel az eljárással elérhető, hogy a méh összehúzódó tevékenysége (fájások) megmaradnak, de az ezzel járó fájdalomérzés a szülés alatt megszűnik. Ezen fájdalomcsillapító eljárással műtéteket lehet elvégezni úgy, hogy a magzatot gyógyszerkárosodás nem éri, valamint elkerülhető a géi altatás fokozott veszélye. Klinikai vizsgálatok igazolták, hogy az ily módon alkalmazott fájdalomcsillapítás mellett született újszülöttek jobb állapotban jöttek a világra, mint fájdalomcsillapítás nélkül.

A fájdalomcsillapítás a szülésnek csak bizonyos időszakában alkalmazható csak, megfelelő fájástevékenység (5-6 percenként jelentkező, normális erősségű fájások) és minimum két ujjnyi, maximum három ujjnyi tágasságú méhszáj esetén. A túl korai, ill. túl késői alkalmazás a szülés menetét károsan befolyásolhatja.

Mint minden orvosi beavatkozásnak, így ezen fájdalomcsillapítási eljárásnak is lehetnek szövődményei:

- csökkenhet a méhizomzat összehúzódásának ereje és így a szülés ideje megnyúlhat
- előfordulhat a kanülálás során a gerincvelő burkának vagy valamelyik idegnek a sérülése, amelyek átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, nagyon súlyos esetben bénuláshoz vezethetnek.

A páciens neve:

Aláírással igazolom, hogy a szülészeti fájdalomcsillapítással kapcsolatos felvilágosítást megkaptam, ennek elvégzését ezt követően:

Páciens aláírása

Férj (hozzátartozó) aláírása

kérem

.....

nem kérem

.....

Dombóvár, 20..... év hó nap

Felvilágosító orvos: