



## Kanizsai Dorottya Kórház

Főigazgató: Dr. Brünner Szilveszter

Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

Osztályvezető: Dr. Orosházi Attila

Cím: 8800, Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

Tel: 93/502-024, Fax: 93/502-064

Email: [szuleszet@nkkorhaz.hu](mailto:szuleszet@nkkorhaz.hu)



BNY-NÖGYÖGY- 01

A beteg neve: \_\_\_\_\_

A beteg TAJ száma: \_\_\_\_\_

Lakcíme: \_\_\_\_\_

Születési neve: \_\_\_\_\_

Anyja neve: \_\_\_\_\_

### TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOTAT SZÜLÉS ELŐTT ÁLLÓ NŐK RÉSZÉRE

Ön bizonyára felkészült a szülésre, és tájékozódott a szülés lefolyásáról, az esetleges beavatkozásokról. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke(i) egészségének megőrzése érdekében történnek és a szülés biztonságát szolgálják. Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is szükség van.

A szülőszobán történő felvétele után az alábbi vizsgálatokat végezzük el:

- ellenőrizzük a magzat szív működését,
- illetve úgynevezett belső vizsgálatot végzünk.

A belső vizsgálat a hüvelyen át történik, amelynek során megállapítjuk a méhszáj tágasságát és a burok állapotát. Mindezekben túlmenően vérnyomásmérést és vizeletvizsgálatot is végzünk.

A szülés előrehaladottságától függően az Önnel történt egyeztetés után kerülhet sor a szeméremszórt leborotvására és a beöntésre.

A vajúdas során gyakran ellenőrizzük a magzati szív működést kis kézi készülékkel, de szükség esetén folyamatos ellenőrzésre is, egy, a hasfalra erősített műszer segítségével.

A szülés haladását, a méhszáj tágulását időközönként belső, hüvelyi vizsgálatokkal követjük.

Sok esetben szükségessé válik (anyai vagy magzati érdekből) a burok megrepesztése és a méhtevékenység renyhülése esetén Oxytocin infúzió adása.

Néha előfordul, hogy a magzatvíz zöldesen elszíneződik, vagy a magzat szív működése kissé eltér a normálistól. Ilyen esetben folyamatosan ellenőrizzük a magzat állapotát, hogy kellő időben tudjunk beavatkozni az érdekében.

A szülés alatt lehetnek kellemetlen érzései, akár fájdalmai is. Ennek csökkentésére gyógyszeres (injekciós) keveréket alkalmazunk, illetve önbelégző készülék segítségével gázkeveréket (nitrogén-oxydul-oxygen keveréket) lélegezhet be a méhösszehúzódások alatt, mindezeket csak abban az esetben, ha Ön óhajtja. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat szülésze ismerteti Önnek.

Egyágyas szülőszobánkban meghitt környezetet teremtve biztosítani tudjuk választott hozzátartozójával a vajúdas és a szülést. A kísérő a szülőszobán az általunk biztosított, költségtérítés ellenében igénybe vehető védőruhában lehet csak jelen.

A szülések többsége szülőágyon zajlik, azonban lehetőség van alternatív módokra is.

- az Ön számára kényelmes - bármilyen testhelyzetet választhat.
- biztosított a kádban való vajúdas lehetősége
- gumilabda, bordásfal a vajúdas könnyebbé tételére.
- szülőszék is igénybe vehető.


A magzat megszületésekor - amennyiben szükséges - gátmetszést végzünk. A gátseb és az esetlegesen keletkezett hüvelyfali sérülés ellátása helyi érzéstelenítésben történik. Igen ritkán sérülhet a végbél, vagy a húgyhólyag is. Ritkán előfordul, hogy a méhlepény, vagy a magzataburok nem távozik egészen. Ilyenkor kézzel, vagy műszerrel fájdalomcsillapítást, bódítást követően betapintunk a méh üregébe, és a bennmaradt részeket

A beteg/törv. képv. aláírása \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_ év \_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap  
\_\_\_\_ óra \_\_\_\_ perc



**Kanizsai Dorottya Kórház**  
Főigazgató: Dr. Brünner Szilveszter  
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
Osztályvezető: Dr. Orosházi Attila  
Cím: 8800, Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.  
Tel: 93/502-024, Fax: 93/502-064



Email: [szuleszet@nkkorhaz.hu](mailto:szuleszet@nkkorhaz.hu)

BNY-NOGYOGY- 01

eltávolítjuk. A műtét ~~heg ellenőrzése céljából hasonlóan járunk el~~ akkor is, ha valakinek az előző szülése császármetszéssel végződött.

A legtöbb szülés zavartalanul zajlik. Az esetek egy részében az anya, vagy a magzat, vagy mindkettő veszélyhelyzete esetén műtét beavatkozása (császármetszés, vákuum) válik szükségessé. Ezeket a műtéteket biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármelyik szakaszában. Így szövődmény (utóvérzés, a nemi szervek, vagy a környező szervek, vagy a magzat sérülése, gyulladás, bélműködési vagy sebgyógyulási zavar) csak nagyon ritkán fordul elő.

Amennyiben a méh elégtelen összehúzódásából adódóan bővebb vérzés (atónia), ill. ennek következtében az alvadási faktorok elhasználódása miatt alvadási zavar (DIC) lép fel, minden esetben törekszünk konzervatív módon, gyógyszeresen a vérzés csillapítására. Ha a vérzés ennek ellenére uralhatatlanná válik sor kerülhet életmentő műtétes megoldásra, ritka esetben a méh eltávolítására is.

A császármetszést gerinc közeli érzéstelenítésben, vagy altatásban végezzük. Altatásra csak akkor kerül sor, ha Ön ragaszkodik ehhez, vagy a műtét sürgőssége miatt nincs idő a gerinc közeli érzéstelenítésre. Erről szükség esetén az érzéstelenítést végző (aneszteziológus) orvos ad részletes felvilágosítást. Ha sürgős beavatkozásra a szülés kitolási szakában van szükség, akkor a magzat gyors megszületését a magzat fejére helyezett haranggal, tompa fogóval segítjük. A magzat érdekében végrehajtott vákuumos szülés a magzat számára veszélytelen, a műtétek elvégzése kapcsán ritkán előfordul a hüvelyfal sérülése, melyet biztonságosan el tudunk látni.

Szükség esetén a szülés folyamán segítségül hívunk más szakorvost is. Bármilyen felmerülő kérdésére a szülőszoba személyzete készséggel ad további felvilágosítást.

Intézetünkben 24 órás gyermekgyógyász (neonatólógus) szolgálat működik.

A beteg kérdései:

---

---

---

---

---

A tájékoztatást adó válaszai:

---

---

---

---

---

☐ A betegnek nem volt kérdése

A tájékoztatást végző orvos neve: \_\_\_\_\_

A tájékoztatást végző orvos aláírása, pecsétje: \_\_\_\_\_

A kezelőorvosomtól kapott kielégítő tájékoztatás ismeretében a beavatkozással/műtéttel kapcsolatos további tájékoztatás jogáról lemondok!


\_\_\_\_\_

A beteg/törv. képv. aláírása

Dátum: \_\_\_\_ év \_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap  
\_\_\_\_ óra \_\_\_\_ perc



**Kanizsai Dorottya Kórház**  
Főigazgató: Dr. Brünner Szilveszter  
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
Osztályvezető: Dr. Orosházi Attila  
Cím: 8800, Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.  
Tel: 93/502-024, Fax: 93/502-064



Email: szuleszet@nikkorhaz.hu

A beteg /törv.képv.aláírása

BNY-NOGYOGY-01

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti tájékoztatás megtörtént és a beteg/törvényes képviselője sajátkezűleg írta alá.

\* A fentieket aláírásommal tanúsítom:

1.Tanú: \_\_\_\_\_ Lakcíme: \_\_\_\_\_

2.Tanú: \_\_\_\_\_ Lakcíme: \_\_\_\_\_

☐ A beteg írásbeli nyilatkozatra nem képes, az alábbi két tanú jelenlétében szóban vagy más módon tette meg a nyilatkozatát.

A beavatkozással kapcsolatos írásbeli és szóbeli tájékoztatást megkaptam, lehetőségem van arra, hogy azt elolvassam és orvosommal megbeszéljem. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam és ez alapján a beavatkozásba beleegyezem és kérem.

\* A dokumentum tanúk aláírása nélkül is hiteles.

A beteg/törv.képv.aláírása

Dátum: \_\_\_\_ év \_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap  
\_\_\_\_ óra \_\_\_\_ perc

