	Betegtájékoztató	MU-SZÜL-01.6 M35
		Változat: 01
Tájékoztató magzati ultrahang vizsgálattal kapcsolatosan		Kiadva: 2019.06.01.
		Oldal: 1 / 2

Tisztelt Betegünk!

Az Ön esetében –a hatályos terhesgondozói protokollnak megfelelően– magzati ultrahang vizsgálat elvégzése javasolt. Az ultrahang vizsgálat célja egyes fejlődési rendellenességek szűrése, a magzat fejlődésének, állapotának megítélése.

Fontos tudni, hogy a magzati ultrahang vizsgálattal nem szűrhető ki minden magzati fejlődési rendellenesség. Irodalmi adatok szerint a különböző szervek fejlődési rendellenességei a következő arányban szűrhetők ki:

1. Központi idegrendszer 71-88%
2. Szív, erek 4,5-59% (ezeknek csak 1/3-a ismerhető fel a 24. hét előtt)
3. Csont 37%
4. Húgyutak 54-88%
5. Emésztőrendszer 54-65%
6. Arc 18%
7. Hasfal 65%
8. Nyitott gerinc 66% (a 24. hét előtt)

A vizsgálat a Magyarországon érvényes *(Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a koraterhességi diagnosztikus és az alap (basic) ultrahang-szűrővizsgálatokról - hatályos: 2017.02.20 2017. EüK. 3. szám közlemény 2 - Típusa: klinikai egészségügyi szakmai irányelv - Azonosító: 002016 - Érvényesség időtartama: 2020. 12. 31.)* szakmai protokoll szerint történik.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét a biokémiai, DNS alapú szűrés, valamint a magzati kromoszóma vizsgálat lehetőségére, melyek részletei a következők: ezen vizsgálatok lényege, hogy az anyai vérben keringő magzati DNS segítségével történik a szűrés. A vizsgálathoz anyától vért vesznek, amely ezután laboratóriumba kerül, ahol elvégzik a szükséges vizsgálatokat.

A vérvételt követően 1-2 hét múlva a várandós megkapja a szűrési eredményeket laikus által is értelmezhető formában. A szűrés elsősorban számbeli kromoszóma rendellenességek szűrésére alkalmas, viszonylag nagy pontossággal. Ebből következően a szűrés nem észlel minden genetikai rendellenességet.


Az anyai vérből végezhető szűrések térítéskötelesek, ezeket a társadalombiztosítás nem támogatja, a további részletekről a vizsgálatok hivatalos termékismertetői az irányadók.

Ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri, akkor a terhesség a 20. hetéig – a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig – szakítható meg.

A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg, ha:

- az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok, vagy
- a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség áll fenn.

Az ultrahang vizsgálat előtt speciális teendő nem szükséges.

	Betegtájékoztató	MU-SZÜL-01.6 M35
		<i>Változat:</i> 01
Tájékoztató magzati ultrahang vizsgálattal kapcsolatosan		<i>Kiadva:</i> 2019.06.01.
		<i>Oldal:</i> 2 / 2

A beavatkozás során a jobb ultrahang-képminőség érdekében ultrahangzselét helyezük az ultrahang vizsgálófejre, majd a hasra helyezett, vagy hüvelybe vezetett vizsgálóeszköz segítségével elvégezzük a szükséges képalkotó vizsgálatot. Maga a hüvelyi ultrahang vizsgálat enyhe kellemetlenséget okozhat, de az indokoltan történő eljárásnak egyéb kockázata, szövődménye nem ismert.

A beavatkozást követő időszak további speciális teendőt nem igényel, Ön a vizsgálat végeztével otthonába távozhat.

További kérdés(ek) esetén kereshető személy(ek) megnevezése: ultrahang laborban dolgozó asszisztensnő, ultrahang laborba beosztott orvos, ultrahanglabor vezető orvos, a beavatkozást végző (kezelő)orvos, továbbá az intézetvezető.