

Szülés illetve műtét utáni történések:

A magzat megszületése után leválik a lepény, - távozik, néha, amennyiben magától nem válik le, le kell választani. Ez altatásban, ill. ha erős vérzés miatt a gyorsasági is szükséges, bódításban történik. Ezt követi a gátseb hüvelyseb megvarrása. ill. a méh un. Bumm-kanállal történő kiürítése. Szüléstől számított két óra hosszat a szülőszobán kell maradni megfigyelésre, ha minden rendben van, kikerül a gyermekágyas osztályra. Ötödik napon varratszedés, hatodik napon – amennyiben gyermekét is rendben találja a gyermekgyógyász – távozhat az osztályról.

Császármetszést követően 48 órás szubintenzív megfigyelésre az őrzőszobába kerül, ahol műszerekkel, vér és vizelet vizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénakanüljén keresztül pótoljuk a folyadékvesztéseket, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét min. 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak kellően éber állapotban kap, enni pedig csak kellőképpen beindult bélműködés után. Műtét után a belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak, vagy nagyon ritkán el is záródhatnak ismételt műtetre lehet szükség. Műtét után felléphet lázas állapot, melyet gyógyszerekkel csillapíthatunk. Zavartalan gyógyulás esetén – ha a gyermekgyógyász az újszülött gyermekét is hazaadhatónak tartja, a 6. napon varratszedést követően távozhat osztályunkról.

Várható következmények:

Mind hüvelyi úton, mind császármetszéssel való szülés után kb. hat héten át un. Gyermekágyi folyása lesz. Ez az első 1-2 napban szinte vér, majd egyre kevesebb és színtelenebb lesz. Hüvelyi szülés ill. császármetszés után is szülhet még a későbbiekben hüvelyi úton.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A hüvelyi szülés alternatív megoldása a császármetszés. Osztályunkon császármetszést az anya kérésére nem végzünk, csak szakmai indokok alapján. A szívófogó nem a császármetszés alternatív megoldása, hanem egy kényszerhelyzet, amikor üregben lévő koponyánál magzati érdekből a szülés gyors befejezésére van szükség. A császármetszésnek nincs alternatív megoldása.

Mi a teendő a szülés és császármetszés után, elbocsátást követően?

Távozás után családorvosát, ill. gyermekorvosát keresse fel. Hat hét múlva kontroll vizsgálaton jelenjen meg. Kontroll vizsgálatig kímélő életmód, valamint nemiélet tilalma javasolt.

A szülés, szívófogó illetve császármetszés elmaradásának következményei:

Őn és születendő gyermek meghalhat ill. súlyos, vissza nem fordítható egészségkárosodást szenvedhet.

Beleegyező nyilatkozat:

A szülésről, szívófogó, császármetszés műleti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

Szekszárd,év.....hó.....nap

Elutasító nyilatkozat:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása-mely a beavatkozás elmaradás esetén előforduló következményeket is tartalmazta - ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....

.....

a felvilágosítást végző személy

beteg / törvényes képviselő aláírása

tanú aláírása

tanú aláírása

Szekszárd,év.....hó.....nap