

Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály
Szekszárd

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ LAP

/7./ Dokumentum címe: **Szülés, szívfogó, császármetszés.**

Beteg neve:..... TAJ száma:.....

Tisztelt betegünk!

Tájékoztatjuk, hogy Ön belátható időn belül szülni fog. Ennek kapcsán szükség lehet gyors befejezésére, szívfogó végzésére, vagy császármetszés műtetre. A Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály a szülésről illetve annak műtétes befejezéséről szeretne tájékoztatást adni, hogy –mindent mérlegelve- döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A hüvelyi szülés a magzat világra jövetelének természetes útja. Előfordulhat olyan helyzet, hogy a szülés utolsó fázisában, a kitolási szakban szívfogót kell alkalmazni a magzat megszületése érdekében. Ez műtétes szülésbefejezés. A szülés, illetve a terhesség bármely szakaszában anyai, vagy magzati érdekből illetve okból szükség lehet császármetszésre, melynek alkalmazásával a magzat a természetes szülő utakat megkerülve jön a világra. A szívfogó és a császármetszés nem egymás alternatív lehetőségei.

A beavatkozás célja:

Szülés: amennyiben minden lehetőség adott a magzat a szülés tágalási és kitolási szakasza után a szülőcsatornán keresztül jön világra. E mód a természetes és élettani folyamat. Szívfogó: Eltűnt méhszájnal, amikor a magzati koponya a medence üreg alján helyezkedik és a magzat életét illetve egészségét veszélyeztető okból szülés gyors befejezésére van szükség, akkor alkalmazható megoldás. Császármetszés: a terhesség és a szülés bármely időszakában anyai vagy magzati okból nem javasolt, vagy nem lehetséges a természetes szülés, ezért a magzatot hasi műtét segítségével kell világra hozni.

Hogyan történik a beavatkozás?

Hüvelyi szülésnél: a fájások kezdete után a tágalási szak alatt „tűnik” el a méhszáj, majd ezt követi a kitolási szak, mely alatt a magzat a szülőcsatornán végighalad. Szívfogónál: a medence ürege alján elhelyezkedő koponyára egy harang alakú eszközt helyezünk fel majd vákuumot létesítünk benne, melynek következtében az eszközzel húzást lehet gyakorolni a fejre és így segíteni a magzat megszületését. Császármetszésnél: az altató orvos által javasolt érzéstelenítési módban, a megfelelő előkészítést követően, az előző műtét vagy műtétek metszésétől, az Ön adottságaitól és a magzat érdekétől függően nyitjuk meg a hasat a szeméremcsonttól a köldökig, vagy a szeméremcsont felett harántul.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Nagy mértékben emelheti a szövődményeket a terhesség alatt kialakult toxaemia.

Szülésnél, szívfogónál: láz, vérzés, vérzékenység kialakulása, méh, méhnyak, hüvely, valamint a végbél repedése sérülése mely következtében a későbbiekben széklettartási gondjai is lehetnek. Csillapíthatatlan vérzés esetén hasi műtetre és méhének eltávolítására is kényszerülhetünk. Császármetszésnél: csillapíthatatlan vérzés, méh, méhnyak, húgyhólyag és húgylevezető, belek és erek sérülése, mely miatt akár a méh eltávolítására, bélműtetre illetve a hólyag és a veselevezető műtétjére kényszerülhetünk. Mindhárom esetben: Vérzés miatt a szülés vagy császármetszés alatt és után is előfordulhat, hogy vért ill. vérkészítményt kell kapnia. A hüvelyben, a gáton és a hasban ill. a hasfal szövetei között kialakulhat folyadékgyülem, ill. vérömleny. Ennek megelőzésére ill. lebocsátására drain csövet alkalmazunk. Sebfertőződés, gennyesedés, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, vérrögösödés (trombózis, embólia) is előfordulhat, ill. ezek miatt újabb műtetre kényszerülhetünk. Az esetleges szövődmények megelőzésére, ill. gyógyításukra mindent megteszünk.