



## CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Kódszám: SZN/013.

### BETEGTÁJÉKOZTATÓ

#### **túlhordásról, koraszülésről, szülésinductionról császármetszésről**

##### **Koraszülés**

A terhesség betöltött 24-37. hete között beszélünk koraszülésről. Felvételt követően célunk a fájások leállítása, a terhesség kiviselésének biztosítása. A 34. hét előtt „tüdőérlelő” injekciót adunk, és próbáljuk legalább 24 óráig tartani a terhességet, míg a gyógyszer kifejti hatását. Görcsök esetén – szülőszobai ellenőrzés mellett – infúziók, antibiotikumok, injekciók segítségével igyekszünk leállítani a koraszülést. Elfolyt magzatvíz miatt megindult koraszülésnél a 24 óra kivárása után döntünk a szülés befejezésének módjáról, természetesen az Ön egyetértésével. Vérzés esetén annak mértéke dönti el a befejezés módját. Ha a koraszülés nem állítható le, vagy felvételekor már olyan előrehaladott állapotban van, hogy nincs lehetőség leállítani, akkor engedjük azt lezajlani. A szakma szabályai szerint vezetjük a koraszülést. A magzat megszületésekor mindig jelen van gyermekorvos is. A 2000 gr alatti koraszülöttek - a szülőszobai ellátás után – az intenzív újszülött osztályra kerülnek. Önnel a további ellátás ugyanúgy történik, mint érett szülés esetében.

##### **Túlhordás**

Ha a 40. terhességi hét betöltéséig a szülés nem zajlik le, akkor – elsősorban a magzat érdekében – folyamatos kórházi ellenőrzésre van szükség. A 40. terhességi hét betöltésekor terheléses vizsgálatokat végzünk. Ha pozitívnak ítéljük az eredményt, akkor a szülést indukáljuk. Ennek módját a méhszáj érettsége alapján döntjük el. Ha kedvező, akkor burkot repesztünk, és – ha szükséges – Oxytocinos infúzió segítségével fájást keltünk. Ha zárt, „méhszájérlelő zselét” helyezünk fel. 12 órás várakozás után – ha addig nem indul meg a szülés, vagy nem tágul megfelelően a méhszáj – megismétljük a zselé felhelyezését. Ha ekkor sem indul meg a szülés, nem nyílik a méhszáj, császármetszést végzünk. Ha negatív a terheléses vizsgálat, akkor a 41. terhességi hét betöltésekor általában a szülést megindítjuk.



## CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

### BETEGTÁJÉKOZTATÓ

#### **Szülésinductio**

Ha a terhességet valamilyen oknál fogva be kell fejezni - szülésinductiot végzünk. Ha a méhszáj zárt, akkor azt érlelni kell, hogy a szülést megindíthassuk. Az érlelést Prepidil zselé felhelyezésével végezzük. Ha szükséges, bizonyos idő elteltével a felhelyezést megismételjük. Közben többször ellenőrizzük a magzati szív működését, a fájások jelentkezését, vagy hiányát, a vérnyomást, a pulzust. Ha a méhszáj a szülés indításához megérett, burkot repesztünk, szükség esetén Oxytocin infúziós fájáserősítés történik.

Ha a méhszájérlelés, vagy a szülésinductio eredménytelen – császármetszést végzünk. Azonban hozzá kell tennünk, hogy előfordul olyan is, hogy a szülés ugyan megindul, de ennek lezajlása során olyan probléma léphet fel, amely miatt ugyancsak császármetszést kell végezni.

#### **Császármetszés**

Abban az esetben, ha valamilyen ok miatt a hüvelyi szülés nem történhet meg, császármetszést végzünk. Ezek lehetnek anyai és magzati okok, vagy mindkettő, melyekről a műtétet végző orvos Önnek részletes felvilágosítást ad. Ha Ön a műtéti megoldást elfogadja, akkor infúziót adunk, állandó katétert helyezünk fel, majd gerincérzéstelenítésben elvégezzük a császármetszést. Csak akkor altatunk, ha Ön ragaszkodik ehhez, vagy a műtét sürgőssége miatt nincs idő a gerincérzéstelenítésre. A műtét után infúziók folyamatos adásával a gyermekágyas osztály őrzőszobájába kerül megfigyelésre. Ellenőrizzük a vérnyomást, a pulzust, a vérzés erősségét, a méh összehúzódását, a vizelet mennyiségét. Fájdalomcsillapítókat, méhösszehúzókat folyamatosan adunk. Egy napi fekvés után az infúziót leállítjuk, az állandó katétert eltávolítjuk, osztályos kórterembe helyezük. Néha előfordul, hogy a műtét utáni 3., 4. napon láz jelentkezik. Lázcillapítókat, méhösszehúzókat, szükség esetén antibiotikumokat adunk. Ha erre sem szűnik meg a lázas állapot, akkor altatásban a méhüregből bacterialis tenyésztésre mintát veszünk, majd a méh állapotát ellenőrizzük, a méh üreget Betadin oldattal kiöblítjük. A tovább adott gyógyszerek hatására általában a láz megszűnik.

**Csolnoky Ferenc Kórház**  
**Szülészeti-Nőgyógyászati Osztálya**